

Prevnar 20^{MC}

Pfizer
Vaccins

Vous avez
50 ans
ou **plus?**

Votre risque de pneumonie
à pneumocoque augmente.

MÊME LES
HÉROS
*comme vous pouvez penser
à la prévention de la*
**PNEUMONIE À
PNEUMOCOQUE**

* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif de la population générale.

**DISCUTEZ DE PREVJAR 20^{MC} AVEC VOTRE
MÉDECIN, VOTRE INFIRMIÈRE OU
VOTRE PHARMACIEN.**

Prevnar 20 est un vaccin antipneumococcique qui contribue à protéger le vacciné contre certaines maladies comme la pneumonie, la pneumonie bactériémique, la sepsie ou la bactériémie et la méningite causées par 20 types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*.

Prevnar 20 n'est pas indiqué pour réduire les complications liées à la pneumonie pneumococcique, comme l'hospitalisation.

Qu'est-ce qu'une pneumonie à pneumocoque?



Une infection des poumons causée par une bactérie courante, *Streptococcus pneumoniae*



Une infection qui se transmet d'une personne à une autre lors de contacts étroits ou lorsqu'une personne tousse ou parle.



Une infection qui peut mettre la vie en danger et nécessiter une hospitalisation ou l'admission dans une unité de soins intensifs.

Prevnar 20 n'est pas indiqué pour réduire les complications liées aux pneumocoques, comme l'hospitalisation et la mort.

Qui présente un risque de pneumonie à pneumocoque?

Des études ont établi que les **adultes de 50 ans ou plus** présentent un risque accru.

Des études ont établi que les **adultes de 18 ans ou plus** avec l'un de ces facteurs de risque présentaient un risque accru* :

Diabète



Augmentation du risque de 3 fois par rapport aux adultes en santé

Tabagisme



Augmentation du risque de 3 à 4 fois par rapport aux adultes en santé

Maladie cardiaque chronique



Augmentation du risque de 4 à 5 fois par rapport aux adultes en santé

Maladie pulmonaire chronique†



Augmentation du risque de 4 à 10 fois par rapport aux adultes en santé

† Incluant l'asthme et la MPOC.

Des études ont mis en évidence d'autres facteurs associés à une hausse du risque de pneumonie à pneumocoque :

- Cancer
- Alcoolisme
- Vie en établissement de soins de longue durée
- Maladie hépatique chronique
- Certaines affections neurologiques

Découvrez si vous présentez un risque accru sur le site Web pour les consommateurs

Prevnar20.ca/fr

MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique

* Les taux de pneumocoque, provenant de bases de données sur les soins de santé aux États-Unis recueillis entre 2006 et 2010, ont été comparés chez des adultes immunocompétents atteints de maladies chroniques, chez des adultes immunodéprimés et chez des adultes exempts de ces maladies. Les profils de risque et les épisodes de pneumocoque – pneumonie toutes causes confondues, pneumonie à pneumocoque et pneumocoques invasives – ont été établis sur la base des codes de diagnostic, d'intervention et de traitement.

Elle peut être prévenue par la vaccination

Prevnar 20 est un vaccin protégeant contre la pneumonie à pneumocoque causée par **20 sérotypes de *Streptococcus pneumoniae*** (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F et 33F).

Une dose du vaccin Prevnar 20 peut aider à prévenir la pneumonie à pneumocoque.



* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif de la population générale.

Prevnar 20 ne prévient que les maladies causées par les types de la bactérie *S. pneumoniae* présents dans le vaccin, et il ne réduit pas les complications liées aux pneumocoques, comme l'hospitalisation.

Prevnar 20 ne doit pas être administré aux personnes allergiques (hypersensibles) aux substances actives qu'il renferme, à tout autre ingrédient du produit ou à tout autre vaccin qui contient l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec Prevnar 20 si :

- vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de Prevnar 20, de Prevnar 13 ou de Prevnar, par exemple une réaction allergique ou des difficultés à respirer;
- vous avez une maladie sévère ou une forte fièvre;
- vous avez un trouble de la coagulation ou avez facilement des ecchymoses (bleus);
- votre système immunitaire est affaibli par une maladie ou par un médicament; vous pourriez ne pas retirer tous les bienfaits possibles de Prevnar 20.

Si vous êtes enceinte, croyez l'être ou prévoyez le devenir, ou encore si vous allaitez, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de recevoir ce vaccin.

Les effets secondaires très fréquents, qui ont été signalés chez plus de 1 personne sur 10, sont les maux de tête, les douleurs articulaires ou musculaires, la douleur ou la sensibilité au point d'injection et la fatigue. Les effets secondaires fréquents, qui ont été signalés chez plus de 1 personne sur 100, mais au maximum chez 1 personne sur 10 sont l'enflure ou la rougeur au point d'injection et la fièvre. Les effets peu fréquents, rapportés par plus de 1 personne sur 1000, mais au maximum chez 1 personne sur 100 sont les réactions allergiques (pouvant provoquer de l'enflure, un essoufflement et une respiration sifflante), la diarrhée, les nausées et les vomissements, les éruptions cutanées et l'enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant causer une difficulté à avaler ou à respirer, les démangeaisons ou l'urticaire au point d'injection, l'enflure des glandes du cou, des aisselles ou de l'aîne, et les frissons. Des réactions allergiques sévères, des états de choc ou des collapsus cardiovasculaires ont été observés chez des personnes ayant reçu Prevnar 13, et pourraient aussi être observés chez les personnes recevant Prevnar 20.

Comme tous les vaccins, Prevnar 20 ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent.

Prevnar 20 est remboursé par certains régimes d'assurance privés. Pour savoir si votre régime le rembourse, communiquez avec votre assureur et fournissez le DIN 02527049.

Aidez à vous protéger contre
la pneumonie à pneumocoque

MÊME LES
HÉROS
comme vous peuvent
penser à une protection.

* Cas fictif pouvant ne pas être représentatif
de la population générale.

**DISCUTEZ DE PREVJAR 20 AVEC VOTRE
MÉDECIN, VOTRE INFIRMIÈRE OU VOTRE
PHARMACIEN DÈS AUJOURD'HUI.**

Vous ne savez pas trop comment amorcer la discussion?

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si votre situation vous expose à un risque de pneumonie à pneumocoque :

- Votre âge
- Vos problèmes de santé
- Votre système immunitaire
- Vos médicaments

**Prenez dès maintenant
rendez-vous pour vous faire
vacciner** auprès de votre médecin
ou de votre pharmacien, ou en
visitant le site Web à l'intention
des patients **Prevjar20.ca/fr**.



PREVNAR 20^{MC} Wyeth LLC,
Pfizer Canada SRI, licencié
© 2023 Pfizer Canada SRI,
Kirkland (Québec) H9J 2M5
PP-PNR-CAN-0042-FR

